

喘息のくすり一覧

監修／日本アレルギー協会理事長 東京大学名誉教授 宮本昭正

この一覧表の使用方法 (医師と患者の相互理解を深めるために)

- (1) 初診時、従来使われていた薬剤の確認に。
- (2) 投薬時、本一覧を見せながら説明することにより誤認・誤用を防げる。
- (3) 再診時、服用された薬剤の効果を正しく確認できる。
- (4) 通常用量*が示されている。

* 用量は各薬剤の通常用量のみを示しています。使用時には、添付文書を確認してください。

喘息治療の目標

- 健常人と変わらない日常生活が送れること。
正常な発育が保たれること。
- 正常に近い呼吸機能を維持すること。
 - ・ PEFの変動が予測値の20%未満。
 - ・ PEFが予測値の80%以上。
- 夜間や早朝の咳や呼吸困難がなく十分な夜間睡眠が可能なこと。
- 喘息発作が起こらないこと。
- 喘息死の回避。
- 治療薬による副作用がないこと。
- 非可逆的な気道リモデリングへの進展を防ぐこと。

(喘息予防・管理ガイドライン2012)より

レルベア100エリプタ14吸入用



レルベア200エリプタ14吸入用



100・200エリプタ1吸入/回、1回/日(成人)

アドエア 100・250・500ディスクス 1吸入/回、2回/日(成人)、50・125・250エアゾール 2吸入/回、2回/日(成人)
100ディスクス 1吸入/回、2回/日、50エアゾール 1~2吸入/回、2回/日(小児)

60吸入用 100 ディスクス



250 ディスクス



500 ディスクス



50エアゾール
120吸入用



125エアゾール
120吸入用



28吸入用 100 ディスクス



250 ディスクス



500 ディスクス



250エアゾール
120吸入用



フルティフォーム
50エアゾール
56吸入用



フルティフォーム
125エアゾール
56吸入用



シムビコート
タービュヘイラー
30吸入



シムビコート
タービュヘイラー
60吸入



50エアゾール2吸入/回、2回/日(成人)
症状に応じて、125エアゾール2~4吸入/回、2回/日(成人)

1~4吸入/回、2回/日(成人) 1~4吸入/回、2回/日(成人)
維持療法として1回1吸入あるいは2吸入を1日2回投与している患者は、発作発現時に本剤の頓用吸入を追加で行うことができる。

フルタイド 100~400 μ g/回、2回/日(成人) 50~100 μ g/回、2回/日(小児)

50 ディスカス



100 ディスカス



200 ディスカス



50 μ gエアゾール
120吸入用



100 μ gエアゾール
60吸入用



50ロタディスク



100ロタディスク



200ロタディスク



ディスクヘラー



キュバール50
エアゾール



2吸入/回、2回/日(成人)
1吸入/回、2回/日(小児)

キュバール100
エアゾール



1吸入/回
2回/日(成人)

アズマネックス
ツイストヘラー
100 μ g 60吸入



100 μ g/回、2回/日(成人)

アズマネックス
ツイストヘラー
200 μ g 60吸入



200 μ g/回、1回/日(成人)

オルベスコ50 μ g
インヘラー112吸入用



オルベスコ100 μ g
インヘラー56吸入用



オルベスコ100 μ g
インヘラー112吸入用



オルベスコ200 μ g
インヘラー56吸入用



100~400 μ g/回
1回/日(成人)

パルミコート100 μ g
タービュヘイラー
112吸入



100~400 μ g/回、2回/日(成人)

パルミコート200 μ g
タービュヘイラー
56吸入



100~200 μ g/回、2回/日(小児)

パルミコート200 μ g
タービュヘイラー
112吸入



パルミコート吸入液
0.25mg 0.5mg



0.5mg/回、2回/日
または1mg/回、1回/日(成人)

0.25mg/回、2回/日
または0.5mg/回、1回/日
(6か月以上の小児)

副腎皮質ステロイド薬

プレドニゾン錠 1mg



5~60錠/日、1~4回/日 (成人)

プレドニゾン錠 5mg



1~12錠/日、1~4回/日 (成人)

メドロール錠 2mg



2~24錠/日、1~4回/日 (成人)

デカドロン錠 0.5mg



1~16錠/日、1~4回/日 (成人)

リンデロン錠 0.5mg



1~16錠/日、1~4回/日 (成人)

気管支拡張薬

① キサンチン誘導体

テオドール錠 50mg



4錠/回、2回/日 (成人)
または8錠/回、1回/日 (成人)
2~4錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 100mg



2錠/回、2回/日 (成人)
または4錠/回、1回/日 (成人)
1~2錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 200mg



1錠/回、2回/日 (成人)
または2錠/回、1回/日 (成人)

テオロング錠 200mg



1錠/回、2回/日 (成人)

スロービッドカプセル 100mg



2カプセル/回、2回/日 (成人)
1~2カプセル/回、2回/日 (小児)

スロービッドカプセル 200mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

ユニフィルLA錠 100mg



4錠/回、1回/日 (成人)

ユニフィルLA錠 200mg



2錠/回、1回/日 (成人)

ユニコン錠 400



1錠/回、1回/日 (成人)

ネオフィリン錠 100mg



3~4錠/日、3~4回/日 (成人)
2~4mg/kg/回、3~4回/日 (小児)

モノフィリン錠 100mg



2~3錠/日、2~3回/日 (成人)

アストフィリン配合錠



1~2錠/回、2~3回/日 (成人)

② 交感神経刺激薬

セレベント 50µg/回、2回/日 (成人) 25µg/回、2回/日 (小児)

50 ディスカス



25 ロタディスク 50 ロタディスク



ディスクヘラー



② 交感神経刺激薬

ベネトリン
吸入液
0.5%



0.3~0.5mL/回 (成人)
0.1~0.3mL/回 (小児)

ベネトリン
シロップ
0.04%



0.75mL/kg/日
3回/日 (乳幼児)

サルタノール
インヘラー
100μg



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

アイロミール
エアゾール
100μg



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

ペロテック
エロゾル
100



2吸入/回 (成人)

ストメリンD
エアロゾル



1吸入/回 (成人)

メプチンエア
10μg
吸入100回



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

メプチンキッドエア
5μg
吸入100回



4吸入/回 (成人)
2吸入/回 (小児)

メプチン
クリックヘラー
10μg



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

メプチン
吸入液
0.01%



0.3~0.5mL/回 (成人)
0.1~0.3mL/回 (小児)

メプチン吸入液
ユニット
0.3mL 0.5mL



アスプールの液
(0.5%)



0.6mL/回 (成人)

ホクナリンテープ



0.5mg/回、1回/日 (0.5~3歳未満)
1mg/回、1回/日 (3~9歳未満)
2mg/回、1回/日 (成人・9歳以上)


(胸部、背部、上腕部のいずれかに貼付)

ホクナリン錠1mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ホクナリンドライシロップ
0.1%小児用



40mg/kg/日、2回/日 (小児)

ベネトリン錠2mg



2錠/回、3回/日 (成人)
0.3mg/kg/回、3回/日 (小児)

プリカニール錠2mg



2錠/回、3回/日 (成人)
1錠/回、3回/日 (6歳以上)
1/2錠/回、3回/日 (5歳以下)

ベラチン錠1mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ベラチンドライシロップ
小児用0.1%



40mg/kg/日、2回/日 (小児)

メプチンミニ錠25μg



2錠/回、1~2回/日 (成人)
1錠/回、1~2回/日 (6歳以上の小児)

メプチン錠50μg



1錠/回、1~2回/日 (成人)

ペロテック錠2.5mg



1錠/回、3回/日

■ 気管支拡張薬

② 交感神経刺激薬

イソパル・P
配合カプセル



2カプセル/回、3回/日 (成人)
1カプセル/回、3回/日
(6歳以上の小児)

スピロペント錠
10μg



2錠/回、2回/日 (成人)
0.3μg/kg/回、2回/日
(5歳以上の小児)

③ 副交感神経遮断薬

アトロベント
エロゾル20μg

1~2吸入/回
3~4回/日 (成人)



テルシガン
エロゾル100μg

1~2吸入/回
3回/日 (成人)



■ 抗アレルギー薬


① ロイコトリエン拮抗薬

オノンカプセル112.5mg



450mg/日、2回/日 (成人)

オノンドライシロップ10%



7mg/kg/日、2回/日 (小児)

アコレート錠20mg



40~80mg/日、2回/日 (成人)

シングレアチュアブル錠 5mg



1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

シングレア錠 5mg




2錠/回、1回/日 (成人)

シングレア錠10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

シングレア細粒4mg



4mg/回、1回/日 (1歳以上6歳未満の小児)

キプレスチュアブル錠5mg




1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

キプレス錠5mg




2錠/回、1回/日 (成人)

キプレス錠10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

キプレス細粒4mg



4mg/回、1回/日 (1歳以上6歳未満の小児)

② メディエーター遊離抑制薬

インタール
エアロゾル1mg

2噴霧/回、4回/日
(成人・小児)



インタールカプセル



1カプセル/回、
3~4カプセル/日

インタール吸入液



1アンプル/回、
3~4アンプル/日

リザベンカプセル100mg



1カプセル/回、3回/日 (成人)

② メディエーター遊離抑制薬

ペミラストン錠5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

ペミラストン錠10mg



1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)

ペミラストンドライシロップ0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

アレギサル錠5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

アレギサルドライシロップ0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

ソルファ50mg錠



25~50mg/日、3回/日 (成人)

アレギサル錠10mg



1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)

ケタスカプセル10mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

③ ヒスタミンH₁拮抗薬

ザジテンカプセル1mg




1カプセル/回、2回/日 (成人)

アゼブチン錠1mg



2錠/回、2回/日 (成人)

ゼスラン錠3mg



2錠/回、2回/日 (成人)

ニボラジン錠3mg



2錠/回、2回/日 (成人)

アレジオン錠10



2錠/回、1回/日 (成人)

アレジオン錠20



1錠/回、1回/日 (成人)

④ トロンボキサナ₂合成阻害薬

ベガ錠100mg



400mg/日、2回/日 (成人)

ドメナン錠200mg



400mg/日、2回/日 (成人)

⑤ トロンボキサナ₂拮抗薬

プロニカ錠40



2錠/回、1回/日 (成人)

プロニカ錠80



1錠/回、1回/日 (成人)

⑥ TH₂サイトカイン阻害薬

アイビーディカプセル100



1カプセル/回、3回/日 (成人)

ツムラ-19 (ツムラ小青竜湯エキス顆粒)



9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-29 (ツムラ麦門冬湯エキス顆粒)



9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-96 (ツムラ柴朴湯エキス顆粒)



7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N19 (コタロー小青竜湯エキス細粒)



7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N29 (コタロー麦門冬湯エキス細粒)



15g/日、2~3回/日 (成人)

N55 (コタロー麻杏甘石湯エキス細粒)



6g/日、2~3回/日 (成人)

EK-19 (クラシエ小青竜湯エキス錠)



6g/日、2~3回/日 (成人)

EKT-19 (クラシエ小青竜湯エキス錠)




18錠/日、2~3回/日 (成人)

EK-96 (クラシエ柴朴湯エキス錠)




7.5g/日、2~3回/日 (成人)

KB-19 (クラシエ小青竜湯エキス細粒)



6g/日、2~3回/日 (成人)

KB-96 (クラシエ柴朴湯エキス細粒)



7.5g/日、2~3回/日 (成人)

ムコソルバン錠 15mg



1錠/回、3回/日 (成人)

ムコソルバンLカプセル 45mg



1カプセル/回、1回/日 (成人)

ムコダイン錠250mg



2錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン DS50%



1g/回、3回/日 (成人)
0.02g/kg/回、
3回/日 (小児)

クリアナール錠200mg



2錠/回、3回/日 (成人)

スペリア錠200



2錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン錠500mg



1錠/回、3回/日 (成人)

*用法・用量は『日本医薬品集 医療薬 2014年版』(株)じほう、2013)の記載の通常用量によります。使用時には、各社添付文書を確認してください。

喘息のくすり一覧

監修/日本アレルギー協会理事 宮本昭正
東京大学名誉教授

発行/ライフサイエンス出版
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1
TEL (03) 3664-7900

提供/グラクソ・スミスクライン株式会社

© Life Science Publishing, 2014